

DE LEESTAFEL

FEBRUARI 2017

*Een Maandelijks Selectie van Wetenschappelijk
GE-nieuws*

COLOPROCTOLOGIE

Het in een vroeg stadium opheffen van een ontlastend stoma lijkt veilig.

EARLY CLOSURE OF A TEMPORARY ILEOSTOMY IN PATIENTS WITH RECTAL CANCER: A MULTICENTER RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL, A. DANIELSEN ET AL, ANN SURG

Complete remissie van tumorpositieve lymfeklieren na chemotherapie bij rectumcarcinoom geeft tevens een betere overleving.

THE IMPACT OF THE RADIATION-INDUCED REGRESSION OF POSITIVE NODES ON SURVIVAL IN PATIENTS WITH RECTAL CANCER TREATED WITH CHEMORADIOTHERAPY, BEPPU ET AL, SURGERY 2017 VOLUME 161, ISSUE 2, PAGES 422-432

Upper GI

Pathologische stadiering voorafgaand aan de behandeling van slokdarmkanker draagt bij aan betere voorspelling van de prognose.

PROGNOSTIC VALUE OF PRETREATMENT PATHOLOGICAL TUMOR EXTENT IN PATIENTS TREATED WITH NEOADJUVANT CHEMORADIOTHERAPY PLUS SURGERY FOR ESOPHAGEAL OR JUNCTIONAL CANCER SHAPIRO ET AL, ANNALS OF SURGERY 2017 VOLUME 265, ISSUE 2, PAGES 356-362

Kortdurende antibioticaprofylaxe na gastrectomie geeft geen hogere kans op postoperatieve wondinfecties

RANDOMIZED CLINICAL TRIAL OF 24- VERSUS 72-H ANTIMICROBIAL PROPHYLAXIS IN PATIENTS UNDERGOING OPEN TOTAL GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER TAKAGANE ET AL, BDJ 2017 VOLUME 104 – ISSUE 2, PAGES 158-164

HPB

Histopathologisch fenotype is betere voorspeller voor overleving dan anatomische localisatie bij peri-ampulair adenocarcinoom

ASSOCIATION OF HISTOPATHOLOGIC PHENOTYPE OF PERIAMPULLARY ADENOCARCINOMAS WITH SURVIVAL, J. WILLIAMS ET AL, JAMA SURG. 2017;152(1):82-88

Antibioticaprofylaxe bij laparoscopische cholecyctomie voor cholecystitis voorkomt geen postoperatieve infectieuze complicaties

RANDOMIZED CLINICAL TRIAL OF EXTENDED VERSUS SINGLE-DOSE PERIOPERATIVE ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS FOR ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS, S. LOOZEN ET AL, BJS, FEB 2017 – VOLUME 104 – ISSUE 2, PAGES 151-157

Percutane transhepatische galwegdrainage geeft meer kans op entmetastasen en verlaagde overleving dan endoscopische drainage bij patiënten met een perihilair cholangiocarcinoom

VERIFICATION OF THE ONCOLOGIC INFERIORITY OF PERCUTANEOUS BILIARY DRAINAGE TO ENDOSCOPIC DRAINAGE: A PROPENSITY SCORE MATCHING ANALYSIS OF RESECTABLE PERIHILAR CHOLANGIOCARCINOMA, KOMAYA ET AL, SURGERY: FEBRUARY 2017 VOLUME 161, ISSUE 2, PAGES 394-404

Leverchirurgie

HCC tumoren die geen alfa foetoproteïne produceren hebben betere pathologische kenmerken, minder posttransplantatie recidieven en een betere overleving.

EVALUATION OF PATIENTS WITH HEPATOCELLULAR CARCINOMAS THAT DO NOT PRODUCE A-FETOPROTEIN, ROBERT J. S. COELEN ET AL, JAMA SURG 2017;152(1):55-64

Oudere leverdonoren geven vergelijkbare uitkomsten met jongere donoren.

ACTUAL RISK OF USING VERY AGED DONORS FOR UNSELECTED LIVER TRANSPLANT CANDIDATES: A EUROPEAN SINGLE-CENTER EXPERIENCE IN THE MELD ERA, V. BERTUZZO ET AL, ANNALS OF SURGERY; FEBRUARY 2017 – VOLUME 265 – ISSUE 2 – P 388-396

Bariatrische chirurgie

Het verhoogd risico op depressieve en suicidaliteit na bariatrische chirurgie is vooral te wijten aan reeds bestaande patientenkenmerken.

*SUICIDE, SELF-HARM, AND DEPRESSION AFTER GASTRIC BYPASS SURGERY: A NATIONWIDE COHORT STUDY
Y. LAGERROS ET AL, ANNALS OF SURGERY; FEBRUARY 2017 – VOLUME 265 – ISSUE 2 – P 235-243*