

DE LEESTAFEL

Een Maandelijks Selectie van Wetenschappelijke Gastro-intestinaal nieuws

Coloproctologie

Conservatieve therapie zonder antibiotica vertraagt het herstel niet bij patiënten met ongecompliceerde diverticulitis

RANDOMIZED CLINICAL TRIAL OF OBSERVATIONAL VERSUS ANTIBIOTIC TREATMENT FOR A FIRST EPISODE OF CT-PROVEN UNCOMPLICATED ACUTE DIVERTICULITIS, L. DANIELS ET AL, BJS; 2017 JAN;JAN;104(1):52-61.

Locale excisie als behandeling voor rectumcarcinoom geeft een betere kwaliteit van leven en functionele uitkomst dan mesorectale excisie

BOWEL FUNCTION AND QUALITY OF LIFE AFTER LOCAL EXCISION OR TOTAL MESORECTAL EXCISION FOLLOWING CHEMORADIOTHERAPY FOR RECTAL CANCER S. PUCCIARELLI, ET AL, BJS; 2017 JAN 104(1):138-147

Upper GI

Bij slecht gedifferentieerde, invasievere en/of langere slokdarmtumoren zou resectie van een kleiner aantal lymfeklieren kunnen volstaan om de pN+ status te bepalen

ESOPHAGEAL CANCER: ASSOCIATIONS WITH (PN+) LYMPH NODE METASTASES RICE, THOMAS W ET AL, ANN SURG. 2017 JAN;265(1):122-129

Gezien het risico op lymfekliermetastasering lijkt endoscopisch mucosale resectie niet geschikt voor alle patiënten met ongedifferentieerd maagcarcinoom,

LYMPH NODE METASTASIS IN MUCOSAL GASTRIC CANCER: REAPPRAISAL OF EXPANDED INDICATION OF ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION (ANN SURG) OH, SEUNG-YOUNG ET AL, ANN SURG; JAN;265(1):137-142.

HPB

Het E-PASS model selecteert patienten met een hoog risico op postoperatieve sterfte na resectie van perihilair cholangiocarcinoom

EXTERNAL VALIDATION OF THE ESTIMATION OF PHYSIOLOGIC ABILITY AND SURGICAL STRESS (E-PASS) RISK MODEL TO PREDICT OPERATIVE RISK IN PERIHILAR CHOLANGIOCARCINOMA, ROBERT J. S. COELEN ET AL, JAMA SURG; 2016 DEC 1;151(12):1132-1138.

Chyluslekkage; een frequente complicatie na pancreaschirurgie.

INCIDENCE, RISK FACTORS AND CLINICAL IMPLICATIONS OF CHYLE LEAK AFTER PANCREATIC SURGERY, O. STROBEL ET AL, BJS; 2017 JAN;104(1):108-117

Leverchirurgie

Geen verschil in uitkomsten tussen anatomische en non-anatomische resectie voor hepatocellulair carcinoom

ANATOMICAL VERSUS NON-ANATOMICAL LIVER RESECTION FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA EXCEEDING MILAN CRITERIA, S.-Q. LI ET AL, BJS; 2017 JAN;104(1):118-127

Bariatrische chirurgie

Een meer distale Roux-en-Y gastric Bypass geeft geen grotere gewichtsafname dan een standaard bypass.

STANDARD VS DISTAL ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS IN PATIENTS WITH BODY MASS INDEX 50 TO 60; A DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED CLINICAL TRIAL HILDE RISSTAD ET AL, JAMA SURG; 2016 DEC 1;151(12):1146-1155.

Verlengde antistollingsprofylaxe kan worden overwogen in hoog risico patienten na een gastric-bypass operatie

WHO SHOULD GET EXTENDED THROMBOPROPHYLAXIS AFTER BARIATRIC SURGERY?: A RISK ASSESSMENT TOOL TO GUIDE INDICATIONS FOR POST-DISCHARGE PHARMACOPROPHYLAXIS; AMINIAN, ALI ET AL, ANN SURG; 2017 JAN;265(1):143-150